Mécanique du point et solutions aqueuses

Extrait de l'entête des sujets de la banque PT :

« La **présentation**, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la **clarté et la précision** des raisonnements entreront pour une **part importante** dans l'**appréciation des copies**. En particulier, les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. Les candidats sont invités à encadrer les résultats de leurs calculs. »

Problème 1: Influence de la température sur le produit ionique de l'eau.

On admet que le produit ionique de l'eau varie en fonction de la température T selon la loi $\frac{d(\ln K_e)}{dT} = \frac{\alpha}{T^2}$.

Données : $\alpha = 6894$ en SI et à $T_0 = 298$ K, le produit ionique de l'eau prend la valeur $K_0 = 10^{-14}$.

- 1) Quelle est la dimension de la constante α ?
- 2) Par une intégration, exprimer $\log(K_e)$ en fonction de T . On donnera une expression littérale.
- 3) En déduire l'évolution du pH de l'eau pure en fonction de la température T .
- 4) Calculer le pH de l'eau pure à 0°C , 25°C , 50°C et 75°C .

Dorénavant toutes les solutions considérées sont à la température de 25°C .

I Neutralisation d'un acide fort

- 5) On considère une solution aqueuse S_1 d'hydroxyde de sodium de concentration $C_1 = 12 \text{ mol.L}^{-1}$. Quelle masse d'hydroxyde de sodium solide doit-on peser pour préparer 1 litre de solution S_1 ?
- 6) Pour préparer une solution aqueuse S_2 d'acide chlorhydrique de concentration $C_2 = 0,02 \text{ mol.L}^{-1}$, on utilise une solution commerciale S_3 de densité $d = 1,19$ et de fraction massique $w = 0,37$ en chlorure d'hydrogène.

Rappel : Fraction massique de $A = \frac{\text{masse } A}{\text{masse totale}}$.

- Déterminer la concentration C_3 de la solution S_3 .
 - Calculer le volume de la solution commerciale S_3 que l'on doit prélever pour préparer 1 litre de solution S_2 .
- 7) On ajoute 6 gouttes de la solution S_1 à 1 litre de la solution S_2 .
 - Sachant que le compte-goutte délivre 1 cm^3 en 20 gouttes, que vaut le pH de la solution après cet ajout ?
 - Combien doit-on verser de gouttes de S_1 pour obtenir une solution neutre ? Commenter.

Données : $M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$ $M(O) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$ $M(Cl) = 35,5 \text{ g.mol}^{-1}$ $M(Na) = 23 \text{ g.mol}^{-1}$

II Dilution d'un acide faible

On considère une solution S_a d'acide éthanóique de concentration C . Soit K_a la constante d'acidité du couple $\text{CH}_3\text{COOH} / \text{CH}_3\text{COO}^-$.

Pour les applications numériques : $pK_a = 4,8$.

- 8) Dans le cas où la réaction de CH_3COOH sur l'eau est prépondérante mais cependant l'acide reste faible, démontrer la relation approchée donnant le pH de la solution S_a :

$$pH = \frac{1}{2}(pK_a - \log C).$$

- 9) Faire l'application numérique pour une solution décimolaire d'acide éthanóique et contrôler la validité des hypothèses.
- 10) Vers quelle valeur le pH tend-il lorsqu'on ajoute de plus en plus d'eau pure à un volume fixé d'une solution quelconque ?
- 11) Exprimer en fonction de K_a la limite vers laquelle tend le taux de réaction α de CH_3COOH sur l'eau lorsqu'on dilue de plus en plus la solution S_a avec de l'eau pure. Faire l'application numérique.

Rappel : Taux de réaction ou coefficient de dissociation $\alpha = \frac{n_{réactif} \text{ consommé}}{n_{réactif} \text{ initial}}$.

- 12) La loi de dilution d'Ostwald s'énonce ainsi : "Le taux de dissociation d'un électrolyte faible tend vers 1 lorsque la dilution tend vers l'infini."
A quelle condition portant sur la valeur de K_a cette loi s'applique-t-elle au cas d'un acide faible ?

Problème 2: Solubilité de l'éthanoate d'argent

L'éthanoate d'argent $AgCH_3COO_{(s)}$ est le seul composé ionique susceptible de précipiter. L'ion éthanoate est une base faible. On dissout des cristaux d'éthanoate d'argent dans l'eau jusqu'à saturation.

- 1) Ecrire les équations **des deux équilibres chimiques** auxquels participent les ions éthanoate.
- 2) En raisonnant sur des déplacements d'équilibre, montrer que la solubilité de l'éthanoate d'argent croît lorsqu'on acidifie la solution avec de l'acide nitrique.
Ecrire les **deux relations** liant la solubilité S de l'éthanoate d'argent aux concentrations $[Ag]$, $[CH_3COO^-]$ et $[CH_3COOH]$.

- 3) Notations : K_s pour le produit de solubilité de $AgCH_3COO_{(s)}$ et K_a pour la constante d'acidité du couple CH_3COOH / CH_3COO^- .

Exprimer la solubilité S de l'éthanoate d'argent en fonction uniquement de $h \equiv [H_3O^+]$, K_s et K_a .

- 4) Des mesures ont donné les résultats suivants :

pH	5,00	4,52	4,30	4,15
S en mol.L ⁻¹	0,0815	0,106	0,126	0,143

Vérifier graphiquement l'accord avec la relation $S(h)$ établie précédemment.

- 5) Dédire du graphe précédent les valeurs expérimentales de K_s et K_a , puis celles de pK_s et pK_a .

Problème 3: Voyage au centre de la Terre

La terre est un astre supposé sphérique, de centre C et de rayon R . Le référentiel $\mathcal{R}_g(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ lié à la terre est supposé galiléen (la rotation de la terre n'est pas prise en compte) et le champ de pesanteur, uniforme à la surface de la terre, est noté g .

Pour relier deux villes A et B , un tunnel est foré au travers du globe terrestre. Un mobile assimilable à un point matériel M de masse m part sans vitesse initiale du point A et glisse dans le tunnel sans frottement, selon l'axe (Ox) pour rejoindre B . Sa position est repérée par l'abscisse (Ox) .

L'interaction gravitationnelle exercée par la terre sur M est $\vec{F} = -mg \frac{r}{R} \vec{u}_r$ avec $CM = r(t)$. La distance CO du tunnel au centre de la terre est notée d .

- 1) Donner l'expression de la composante de $\vec{F}$ suivant (Ox) notée F_x . De même pour F_z .
- 2) Déterminer le travail de la force $\vec{F}$ lorsque le mobile M se déplace d'un point de coordonnée x_i à un point de coordonnée x_f .
- 3) En déduire l'expression de l'énergie potentielle de gravitation E_p associée au point M en choisissant l'origine de cette énergie en O .
- 4) Déterminer l'énergie mécanique du mobile en fonction de m , g , R et d . En déduire la vitesse maximale $v_{\max}$ du mobile.
- 5) Le point M possède-t-il une position d'équilibre stable ?
- 6) Déterminer la nature et l'équation horaire $x(t)$ du mouvement de M en utilisant une approche énergétique. Retrouver l'expression de $v_{\max}$.
- 7) Calculer numériquement le temps T nécessaire au mobile pour revenir en A .

Données : $R = 6400$ km et $g = 10$ m.s⁻².